



سازمان بهداشت ایران
اوواره کلی بیمه سلامت استان فارس

با سمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۱۴۰۲/۲۷۸۷۷۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۸:۰۷

پیوست: دارد

۴-عادی

دارای کوئینتامین الگلی مدیریت کیفیت

ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸

سال همار تورم، رشد تولید

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، لارستان و گراش

معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، لارستان و گراش


موضوع: راهنمای تجویز داروی Natamycin

با سلام و احترام:

با عنایت به ابلاغ راهنمای تجویز داروی ناتامایسین توسط معاونت محترم درمان و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۷/۲۴ ۴۰۰/۱۸۶۶۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲۷۴۰۰۵ و همچنین نامه شماره ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ معاون محترم بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، به پیوست، راهنمای تجویز این دارو، جهت استحضار ایفاد می گردد.

بر اساس راهنمای تجویز ابلاغی، این دارو در درمان کراتیت قارچی، بلفاریت یا کوتزکتیویت قارچی در بخش سریابی و بستری اندیکاسیون دارد و صرفً پزشکان متخصص چشم پزشکی، بر اساس مندرجات راهنمای تجویز، برای تجویز این دارو صاحب صلاحیت می باشند که این شرط تخصص در سامانه های سازمان لحاظ شده است.

دکتر علی محمد جعفرپور



رونوشت:


انجمن محترم داروسازان استان فارس جهت استحضار

ش.ش: ۱۴۹۹۹۹

شیراز - خیابان وصال شملی کد پستی: ۷۱۴۵-۷۱۶۴۵-۷۱۳۲۹-۱۴۲۹۷

پست اینترنتی: <http://fr.ihio.gov.ir> وبسایت: <http://info.fr.ihio.gov.ir>





معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

NATAMYCIN

نمایل سین

۱۴۰۲ پاییز

تنظیم و تدوین اولیه:

دکتر جباروند رئیس انجمن چشم پزشکی ایران

دکتر صدوقی دبیر بورد رشته تخصصی چشم پزشکی

دکتر احمدیه فلوشیپ ویتره و رتین استاد علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فکری فلوشیپ ویتره و رتین

دکتر سلام زاده رئیس انجمن علمی متخصصین داروسازان بالینی

دکتر علیمردانی متخصص فارماکوتراپی

دکتر ضایایی متخصص فارماکوتراپی

دکتر ذوقی متخصص فارماکوتراپی

دکتر گودرزی داروساز عمومی

با همکاری :

دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو

مشاور: دکتر سافا زبخشند رئیس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعریف سلامت

بسمه تعالیٰ
راهنمای تجویز دارو

شایط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	شرط تجویز		افراد صاحب صلاحیت تجویز	نام دارو
			کنترال اندیکاسیون	اندیکاسیون		
<p>صرفاً جهت استفاده موضعی چشمی. پیش از مصرف به خوبی تکان داده شود. قبل و بعد از استفاده دست ها شسته شوند.</p> <p>احتیاط کنید تا نوک قطره با چشم یا سایر سطوح تماس پیدا نکند.</p> <p>-در طول درمان استفاده از لنز تماسی ممنوع می باشد.</p>	<p>کراتیت قارچی: یک قطره هر ۱ تا ۲ ساعت در چشم برای ۳ تا ۴ روز، سپس ۶ تا ۸ بار در روز(هر ۳ تا ۴ ساعت). در صورت پاسخ بالینی مناسب طول دوره درمان معمولاً ۲ تا ۳ هفته و یا تا زمان بهبود کراتیت قارچی فعال است (کاهش تدریجی دوز دارو در دوره های ۴ تا ۷ روزه جهت اطمینان از پاکسازی میکروارگانیسم سودمند است).</p> <p>بلفاریت یا کونزوکتیویت قارچی: یک قطره در چشم هر ۴ تا ۶ ساعت.</p>	<p>سوپایی بستری</p>	<p>حساسیت به دارو یا هر کدام از اجزاء فرمولاسیون احتیاط استفاده در بارداری، شیردهی و کودکان</p>	<p>۱) کراتیت قارچی ۲) بلفاریت یا کونزوکتیویت قارچی</p>	<p>متخصص چشم پزشکی</p>	<p>Natamycin 5% (ophthalmic suspension)</p>

- اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و ...)
- تجویز دارو، بر اساس نمونه گیری از سطح چشم یا تایید تشخیص عفونت قارچی یا اسکن کانفوکال، بر حسب نظر پزشک معالج (متخصص چشم پزشکی) می باشد.

• **توصیه ها :**

چشمی: فقط برای استفاده موضعی چشمی، قبل از استفاده خوب تکان دهید. قبل و بعد از استفاده دست ها را بشوید.

• **منابع:**

- Mahmudi S, Masoomi A, Ahmadikia K, Tabatabaei SA, Soleimani M, Rezaie S, Ghahvechian H, Banafshehshan A. Fungal keratitis: An overview of clinical and laboratory aspects. *Mycoses*. 2018 Dec;61(12):916-930
- Up to Date