



باسمه تعالی

معاونت غذا و دارو

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

نام و سمت گیرنده

13

13

13

13

۴. روسای محترم کلیه درمانگاههای دانشگاهی/ دولتی/ خیریه/ خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵. روسای محترم کلیه شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۶. رئیس محترم سازمان نظام پزشکی فارس

۷. رئیس محترم انجمن داروسازان فارس

موضوع اشتباهات دارویی- مصرف همزمان داروهای بیزوپرولول و متوپرولول منجر به برادیکاردی کشنده

با سلام و احترام

به پیوست نامه سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت غذا و دارو، در مورد گزارش یک مورد فوت بیمار بدنبال مصرف همزمان بیزوپرولول و متوپرولول در اثر عدم توجه به الزاماتی مانند گرفتن شرح حال دقیق و آموزش کافی به بیمار و ...، خدمتتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستورات لازم برای اطلاع رسانی به مجموعه تحت پوشش را صادر فرمائید.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر محمدجواد خشنود معاون غذا و دارو

اقدام کننده

دکتر زیبا آقاملکی سروسناری - کارشناس امور دارویی

اطلاعات مدرک

تلفن ۷۴۴۱



Handwritten signature and stamp of Dr. Ziba Aghamaleki Sarosnari.

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک hsr@sums.ac.ir

سرمایه گذاری برای تولید

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: راهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی - مصرف همزمان داروهای بیزوپرولول و متوپرولول منجر به برادیکاردی کشنده در بیمار

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه دارویی به علت عدم توجه به انجام تلفیق دارویی ترخیص و متعاقب آن مصرف همزمان دو داروی مسدودکننده گیرنده بتا یک و عوارض کشنده ی آن منجر به برادیکاردی کشنده در بیمار از یکی از مراکز درمانی کشور به شرح ذیل دریافت نموده است:

بیمار خانم ۷۲ ساله ای بوده که به دلیل مشکلات قلبی عروقی بستری شده و سابقه مصرف داروی بیزوپرولول داشته است. در زمان بستری پس از انجام آنژیوگرافی، داروی بیزوپرولول به داروی متوپرولول تغییر داده می شود. هنگام ترخیص، با توجه به گفته همراه بیمار مبنی بر موجود بودن داروها در منزل، تنها داروهای جدید (متوپرولول و اسپری) توسط اینترن بخش برای بیمار نسخه می شود و توصیه می شود بقیه داروها طبق روال قبل مصرف شود. بیمار در منزل به مدت ۱۰ روز هر دو داروی بیزوپرولول و متوپرولول را همزمان مصرف می کند و با برادیکاردی شدید $PR=27$ مجدد به اورژانس منتقل می شود و علی رغم انجام اقدامات درمانی متاسفانه بیمار فوت شده است.

علت وقوع اشتباه عدم اجرای فرآیند تلفیق دارویی و عدم آموزش بیمار در خصوص مصرف صحیح داروها می باشد.

راهکارهای پیشگیرانه از وقوع اشتباهات دارویی مشابه شامل:

- ✓ گرفتن شرح حال دقیق از داروهای مصرفی بیمار و ثبت دقیق آن در پرونده بیمار
- ✓ توجه به داروهای مصرفی بیمار در هنگام تجویز داروهای جدید به بیمار
- ✓ اجرای دقیق فرایند تلفیق دارویی و تکمیل فرم های مربوطه در هنگام بستری و تغییر بخش بستری و ترخیص بیماران
- ✓ آموزش کافی و لازم به بیماران و مراقبین بیمار در خصوص مصرف صحیح داروها
- ✓ آموزش به بیمار و همراهان که در صورت بروز هرگونه عارضه یا اختلال در زمان مصرف داروها، به سرعت با پزشک معالج تماس حاصل شود.

مراتب جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به کلیه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت خدمتتان

ارسال می گردد.

دکتر نازیلا یوسفی

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

