

تاریخ

۱۴۰۴/۰۶/۰۴ - ۱۴:۵۵:۱۷

شماره داخلی ۳۱۸۸۶۲/۱۴۰۴

شماره ثبت صادره

تاریخ ثبت صادره

پیوست دارد



باسمه تعالی

معاونت غذا و دارو

تولید، دانش بنیان و اشتغال رایی

نام و سمت گیرنده

۱. جناب آقای دکتر امین نیاکان معاون محترم درمان
۲. جناب آقای دکتر اورنگ ایلامی معاون محترم بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان
۳. جناب آقای دکتر دیده بان - رئیس محترم نظام پزشکی استان فارس
۴. جناب آقای محمد منفرد رئیس محترم انجمن داروسازان استان فارس

موضوع راهنمای تجویز واکسن آنفلوآنزای فصلی

باسلام و احترام.

بدینوسیله راهنمای تجویز واکسن آنفلوآنزای فصلی (غیرفعال) به پیوست تقدیم می گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید مطلب مزبور از طریق مقتضی در اختیار مجموعه تحت پوشش قرار گیرد.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر محمدجواد خسود معاون غذا و دارو

اقدام کننده

زینت کشاورزی - متصدی امور دفتری

اطلاعات مدرک

تلفن ۲۷۴۰

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک rdo@sums.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۱۱۶۴

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

پیوست دارد

جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی

رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

جناب آقای دکتر سالاری

مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر خسرو صادق نیت

مشاور وزیر و مدیر کل محترم حوزه وزارتی

جناب آقای دکتر پیر صالحی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر مسعود فیض اربابی

مدیر عامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر عباس مسجدی آرانی

رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران

موضوع: ابلاغ - راهنمای تجویز واکسن آنفلانزای فصلی (غیر فعال)

با سلام و احترام؛

همانگونه که مطلع می‌باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است تدوین و نشر انواع راهنماهای بالینی است که به عنوان یکی از محورهای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می‌باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین و ابلاغ انواع راهنماهای بالینی (شناسنامه و



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۱۱۶۴

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

پوست دارد

استاندارد خدمات، راهنمای تجویز دارو، پروتکل تشخیص و درمان بیماری و... را با اولویت خدمات پر تواتر،
پر هزینه (خدمات، تجهیزات)، دارای پوشش بیمه ای، با حضور جمعی از اساتید حوزه های مختلف، در وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی این امر را عهده دار شده است. لذا در
راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بر مبنای بند ۵ و ۸-۱ سیاستهای کلی سلامت و
ردیف ۲-۳ بند (الف) ماده ۶۹ و ردیف ۱ و ۲ ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبنی
بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای
بالینی توسط وزارت بهداشت "راهنمای تجویز واکسن آنفلوآنزای فصلی (غیر فعال)" به تصویب رسیده و از
تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تایید وزارت متبوع، اعلام می گردد
دانشگاه/ دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این راهنماها در آموزش های بازآموزی
استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با
بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری
راهنماها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.

لازم به ذکر است راهنمای تجویز واکسن مذکور از طریق تارنمای معاونت درمان به آدرس

<http://medcare.behdasht.gov.ir> در دسترس می باشد.

دکتر سید سجاد رضوی
معاون درمان


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان

راهنمای تجویز

واکسن آنفلوآنزای فصلی (غیر فعال)

تابستان ۱۴۰۴

کمیته مشاوران جهت تنظیم و تدوین:

دکتر مرنندی دبیر بورد رشته فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد

دکتر موحدی فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر توکل فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر طباطبایی فوق تخصصی ریه کودکان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر طبرسی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر قانع دبیر بورد رشته فوق تخصصی بیماری های ریه

دکتر مخدومی فوق تخصصی نفرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر بلورساز رییس انجمن پزشکان عفونی کودکان ایران

دکتر رضانی دبیر انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

دکتر محقق فوق تخصص نوزادان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علیمردانی متخصص فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محدثه معصومی متخصص داروسازی بالینی

دکتر رضا اسدالهی راد دکترای عمومی داروسازی

با همکاری:

دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو

مرکز مدیریت بیماری های واگیر معاونت بهداشت

تحت نظر:

دکتر سید سجاد رضوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون درمان

مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان



تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز واکسن آنفلوانزا

نام واکسن	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	مورد مصرف	منع مصرف	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
واکسن آنفلوانزای فصلی سرنگ از پیش پرشده حاوی نیم میلی لیتر محلول تزریقی	- مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای شهری تحت پوشش مرکز بهداشت صرفا مرتبط با برنامه ملی واکسیناسیون و ایمنی سازی کشور می باشد. - مطب	کلیه پزشکان بالینی	کلیه افراد بالای ۶ ماه به ویژه تاکید مصرف در گروههای زیر: - افراد ۶ ماه تا ۵ سال دارای بیماری زمینه ای ریوی، قلبی عروقی (بجز پرفشاری خون)، کلیوی، کبدی، نوروژیک، هماتولوژیک، بیماری های متابولیک مانند دیابت - بیماران دچار نقص ایمنی یا دریافت کننده داروهای سرکوب کننده ایمنی - افراد فاقد طحال یا فقدان عملکردی طحال - کلیه کودکان ۶ ماه تا ۲ سال - کودکان ۶ ماه تا ۵ سال مهد کودکی	- افراد دارای سابقه واکنش های آلرژیک شدید نظیر آنافیلاکسی به واکسن آنفلوانزا و یا هر یک از اجزای واکسن تا ۷ روز پس از واکسیناسیون - وجود علائم خفیف سرماخوردگی منعی برای تزریق واکسن ندارد ولی تب شدید منع تزریق واکسن دارد. - در بیماران با بیماری حاد تنفسی متوسط تا شدید (با یا بدون تب)	0.5 ml تک دوز سالانه بصورت تزریق عضلانی در عضله دلتوئید (در شیرخواران زیر ۲ سال در عضله قدامی خارج ران) در کودکان ۶ ماه تا کمتر از ۹ سال که برای اولین بار واکسن را دریافت می نمایند، دو دوز با فاصله حداقل ۴ هفته	بهترین زمان تزریق واکسن از اواخر شهریور تا ۱۵ ام آبان همان سال است. می توان بعد از زمان طلایی فوق، نیز واکسن را تزریق کرد اما کارایی واکسن کمتر خواهد بود. در صورت ابتلا به عفونت فعال واکسیناسیون بعد از رفع بیماری انجام شود.

نام واکسن	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	مورد مصرف	منع مصرف	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
	-درمانگاه -بیمارستان		-کلیه افراد بالای ۶۵ سال -افراد در گروه سنی ۶ ماه تا ۱۸ سال تحت درمان طولانی مدت با آسپیرین و یا داروهای حاوی سالیسیلات - افراد با چاقی مفرط یا چاقی بیمار گونه (40 BMI≥) -کارکنان سلامت (به ویژه کارکنان شاغل در بیمارستان و در تماس مستقیم با بیماران) - خانم های باردار	-در بیمار با سابقه سندرم گیلن باره به دنبال واکسیناسیون آنفلوآنزا توصیه نمیشود. فقط در صورت خطر بالای آنفلوآنزای شدید در فرد با احتیاط زیر نظر پزشک تجویز شود.	توصیه می شود. در سال های بعد برای این کودکان یک دوز کفایت می کند.	

• توجه:

واکسن نوترکیب تولید داخل در حال حاضر فاقد مجوز مصرف در گروه سنی زیر ۱۸ سال، خانم های باردار و افراد نقص ایمنی می باشد.

• توصیه ها :

- توجه به بروشور و توصیه های کارخانه سازنده واکسن الزامی است.
- کارکنان ارائه دهنده خدمات واکسیناسیون باید در خصوص مدیریت بالینی واکنش های آلرژیک و احیای قلبی ریوی آموزش دیده باشند و تجهیزات احیای قلبی ریوی در محل در دسترس باشد.
- تجویز همزمان با داروهای ضد ویروسی آنفلوآنزا (به منظور پیشگیری) منعی ندارد.
- تزریق همزمان ولی در محل متفاوت با سایر واکسن ها از جمله واکسن کرونا منعی ندارد.
- تزریق در زنان شیرده منعی ندارد.
- تزریق واکسن آنفلوآنزای غیر فعال در نوزادان نارس (کمتر از ۳۷ هفته) که در فصل سرما به سن ۶ ماهگی میرسد مانند سایر شیرخواران ۶ ماه به بالا توصیه میشود.
- تزریق واکسن آنفلوآنزای غیر فعال باید حداقل ۶ ماه بعد از پیوند انجام شود. در مواردی (مانند طغیان بیماری) می توان فاصله را به ۴ ماه کاهش داد ولی در این صورت لازم است در سال اول دو نوبت واکسن به فاصله ۴ هفته تزریق شود. در افراد کاندید پیوند حداقل ۲ هفته قبل از پیوند واکسن تجویز شود (به صورت ایده آل و در صورت امکان ۴ تا ۶ هفته قبل از پیوند جهت سطح آنتی بادی مناسب حفاظتی).
- در کودکانی که لازم و ضروری است تزریق داشته باشند توصیه می شود به سایر افراد خانواده آنها هم تزریق واکسن آنفلوآنزا صورت گیرد:
- شیرخواران و کودکان مبتلا به مشکلات قلبی (به جز پرفشاری خون) ریوی، کلیوی، عصبی، بیماران دچار سوء تغذیه، بیماری مزمن مثل دیابت، ایدز و اختلالات ایمنی، آنمی های همولیتیک مزمن
- در صورت ابتلا فرد به بیماری حاد متوسط تا شدید (با یا بدون تب) لازم است تزریق واکسن تا زمان بهبودی حال عمومی به تعویق افتد.

• منابع:



دستورالعمل واکسیناسیون آنفلوآنزای انسانی- سال ۱۴۰۲ - مرکز مدیریت بیماری های واگیر

• Uptodate 2025