



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ - ۰۹:۰۲:۲۶
شماره داخلی: ۵۶۴۰۷۷/۱۴۰۴
شماره ثبت صادره: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰۲/۳۲۵۶۷
تاریخ ثبت صادره: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ - ۰۹:۴۳:۴۳
پیوست دارد

باسمه تعالی

معاونت غذا و دارو

نام و سمت گیرنده: نان کامل نسبت به نان سفید، بیشتر در دستگاه گوارش می ماند و احساس سیری بیشتری به فرد می دهد که در کنترل وزن و پیشگیری از چاقی موثر می باشد.

ردیف	نام و سمت گیرنده	کد	عملیات
۱	جناب آقای دکتر محمدجواد خشنود "مدیر محترم داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی"		
۲	جناب آقای دکتر منفرد "رئیس محترم انجمن داروسازان استان فارس"		
۳	مسئول فنی محترم داروخانه ویژه		

موضوع اطلاعیه شماره ۱۴۲ با عنوان هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی آمپی سیلین تزریقی

با سلام و احترام

پیرو مکاتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۶۹۳۴۹ / ۶۵۸ مورخ ۱۴۰۴ / ۰۹ / ۲۵ مربوط به اطلاعیه شماره ۱۴۲ با عنوان " هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی آمپی سیلین تزریقی " جهت استحضار و اطلاع رسانی گسترده به همه مراکز دارویی، بهداشتی و درمانی ارسال می گردد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی فراورده مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر محمدعظیم رافت سرپرست مدیریت دارو و فراورده های بیولوژیکی و مواد

اقدام کننده

زهرا اصلان آبادی - کارشناس امور دارویی معاونت غذا و دارو

اطلاعات مدرک

تلفن ۷۴۸۷

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک



شماره: ۶۵۸/۶۹۳۴۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
پیوست: دارد
سرمايه گذاري براي توليد

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور
موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴۲ با عنوان هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی آمپی سیلین تزریقی
با سلام و احترام؛

پیرو دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم رعایت نکات لازم در هنگام مصرف داروی آمپی سیلین تزریقی، به پیوست اطلاعیه شماره ۱۴۲ این دفتر با عنوان "هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی آمپی سیلین تزریقی" جهت استحضار و اطلاع رسانی گسترده به همه مراکز دارویی، بهداشتی و درمانی تحت پوشش آن معاونت خدمتتان ارسال می‌شود.

دکتر نازیلا یوسفی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت

رونوشت :

جناب آقای معنوی دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه سلامت: جهت استحضار و دستور اقدام لازم
جناب آقای دکتر حاجی میرزایی سرپرست محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان: جهت استحضار و دستور اقدام لازم
جناب آقای دکتر عبدالهی اصل مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل: جهت استحضار و دستور اقدام لازم
جناب آقای قربانی متصدی محترم امور دفتری



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳



اطلاعیه شماره ۱۴۲ دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۰

موضوع: هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی آمپی سیلین تزریقی

پیرو دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم توجه به رعایت نکات ایمنی در مصرف داروی تزریقی آمپی سیلین یادآور می‌گردد که در منابع علمی معتبر نکاتی به شرح ذیل، جهت آماده سازی جهت تزریق داروی آمپی سیلین در محلول‌های تزریقی ذکر شده است که رعایت این نکات لازم است در هنگام مصرف فرآورده مذکور مورد توجه قرار گیرد:

✓ داروی آمپی سیلین رقیق شده برای تزریق عضلانی یا وریدی بایستی طی یک ساعت پس از آماده سازی مورد استفاده قرار گیرد.

✓ پایداری داروی آمپی سیلین سدیم وابسته به غلظت دارو، pH، زمان طی شده پس از رقیق سازی و نوع محلول مورد استفاده برای رقیق سازی می باشد. تأثیر غلظت بر پایداری آمپی سیلین به یک اثر خودکاتالیزوری نسبت داده شده است، به گونه‌ای که با افزایش غلظت، سرعت تجزیه نیز افزایش می‌یابد.

✓ در بالغین تزریق وریدی بولوس دوزهای ۱۲۵ تا ۵۰۰ میلی گرم در مدت ۳ تا ۵ دقیقه و دوزهای ۱ تا ۲ گرم در مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انفوزیون شود. در کودکان دوزهای کمتر از ۵۰۰ میلی گرم در مدت ۳ تا ۵ دقیقه و دوزهای بیشتر از ۵۰۰ میلی گرم در مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تزریق شود. در نوزادان نارس با وزن بسیار کم (VLBW) دارای سن ۲۲ تا ۲۷ هفته حاملگی، انفوزیون وریدی در مدت بیشتر از ۲۰ دقیقه انجام شود. انفوزیون سریعتر از مقادیر فوق باعث افزایش خطر تشنج می شود.

✓ پایداری داروی آمپی سیلین در محلول دکستروز به طور چشم گیری طی زمان کاهش می یابد، به طوری که دکستروز باعث تسریع فرآیند هیدرولیز آمپی سیلین و کاهش اثربخشی دارو می گردد. از این رو دکستروز محلول مناسبی جهت تزریق داروی آمپی سیلین نمی باشد.

✓ در همین راستا بر اساس مطالعات صورت گرفته بهترین و سازگارترین محلول برای تزریق وریدی، محلول سدیم کلراید ۰/۹ درصد می باشد.

منابع:

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION

اطلاعیه تخصصی دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت